

L'ANNÉE ORNITHOLOGIQUE

par Jean-Claude Praz, Sion

Une activité ornithologique régulière tout au long de l'année a permis de faire des observations intéressantes, grâce surtout à la visite fréquente des biotopes favorables par une équipe de collaborateurs de plus en plus nombreuses. Un groupe de jeunes est né au Collège de Sion et quelques membres se font déjà remarquer par un travail sérieux et scientifique; il s'agit de B. Michellod et F. Catzeflis, de Sion et de P.-A. Oggier de Riddes (leurs observations sont suivies de G. d. J.).

La Ligue valaisanne pour la protection de la nature a donné au groupe les moyens nécessaires à l'achat du matériel et à l'organisation de courses et de camps. C. Bottani (CB) a continué ses recherches sur la distribution et la biologie de la fauvette orphée dans le Haut-Valais. D'autre part, le baguement des oiseaux a été intensifié cette année et une reprise a déjà récompensé ce travail: une bécassine baguée à Agarn a été tuée quelques jours plus tard en Italie. D'autres observations sont tirées du bulletin d'informations de la Centrale ornithologique suisse de Sempach et de la revue «Nos Oiseaux».

Les aigrettes garzettes (*aigretta garzetta*) se sont montrées en plus petit nombre ce printemps: six observations entre le 11 avril à Leytron (GdJ) et le 21 mai à Agarn (CB); il faut signaler un groupe de sept individus le 5 mai à Aproz (PJC). Un héron grabier (*ardeola ralloides*) a été vu par J.-M. Rapaz à Grône en mai. Les observations de cette espèce méridionale ont été nombreuses en Suisse cette année. Les apparitions du héron bihoreau (*nycti corax nycti corax*) sont également plus fréquentes; plusieurs couples nichent maintenant en Suisse. Un individu le 6 avril à Agarn (CB), dix le 7 avril et 3 le 10 mai à Aproz (PJC). Il semble que ces oiseaux s'introduisent dans la vallée du Rhône et la remontent pour continuer leur migration, car un individu a été trouvé mort dans la vallée de Saas.

23 cigognes blanches (*ciconia ciconia*) ont passé la nuit du 4 au 5 août à Martigny où elles ont pu être photographiées par G. Laurent. C'est le plus grand nombre observé en Suisse ces dernières années. Elles

passent presque chaque année au col Bretolet, ainsi que la cigogne noire (*ciconia nigra*). A Bretolet également un ibis falcinelle (*plegadis falcinellus*) a dû rebrousser chemin devant les attaques d'un faucon pèlerin le 27 septembre (J. de Crousaz).

Les observations de cygnes tuberculés (*cygnus olor*) à Grône et à Aproz en octobre (GdJ) sont probablement dues à l'introduction d'un couple à Sierre. Des oies sauvages (*anser spec.*) ont été signalées à Monthey par R. Voisin (42 le 18 novembre 1967) et dans la vallée du Rhône par Mme de Palézieux, 12 oies probablement des oies rieuses (*anser albifrons*) le 12 mars. Un couple de sarcelles d'hiver (*anas crecca*) a séjourné à Grône jusqu'en mai, le 19, seul le mâle est visible. Y a-t-il eu essai de nidification? Quatre observations de canards souchets (*anas clypeata*) sont faites entre le 11 et le 20 avril à Grône, Aproz et Agarn, tous des mâles. Cette année une nette rousse (*netta rufina*) s'est arrêtée à Ardon du 26 août au 1er septembre (GdJ) de même qu'un fuligule morillon (*aythya fuligula*) le 7 août à Aproz (GdJ).

Les buses variables (*buteo buteo*) ont été nombreuses en période de nidification et des couples ont été vus à Vouvry, Monthey, Riddes, Nendaz, Savièse, Nax, Agarn. Il est vraiment dommage que les garde-chasse et garde-auxiliaires valaisans reçoivent la permission d'abattre ces oiseaux qui d'une part sont très utiles à l'agriculture en détruisant les campagnols et d'autre part ne peuvent faire un dégât appréciable au gibier. Plusieurs observations d'autours (*accipiter gentilis*) ont confirmé que ce rapace garde un effectif régulier dans les Alpes. Trois preuves de nidification et la présence régulière d'individus ou de couples à St-Maurice, Riddes, Evolène, Grône, Agarn. Le passage des bondrées (*pernis apivorus*) a été nul ce printemps (première observation le 1er juin à Savièse, probablement le couple local). Cela est probablement dû à l'échec très élevé de la nidification l'année passée. Une jeune a été dénichée à Savièse; il est vraiment regrettable que l'on se permette de prendre ces oiseaux au nid et de les condamner ensuite à vivre en captivité ou à mourir par manque de soin; il me semble utile de rappeler que tous les rapaces sont protégés en Suisse. La présence du couple de circaète (*circaëtus gallicus*) en Valais a de nouveau été confirmée par plusieurs observations sans que la preuve de nidification ait pu être apportée.

L'aire du faucon pèlerin (*falco peregrinus*) a de nouveau été abandonnée cette année, peut-être à la suite d'un violent orage en mai: des coulées d'eau étaient visibles près de l'emplacement du nid (CB). Un

faucou cobez (*Falco vespertinus*) était de passage le 21 octobre à Monthey (R. Voisin). C. Bottani s'est intéressé cet hiver au faucou crécerelle dans la plaine du Rhône et n'a observé aucun mâle adulte; il sera intéressant de continuer à déterminer le sexe des hivernants de cette espèce pour voir la proportion des mâles et des femelles.

Une gélinotte (*Tetrastes bonasia*) a été vue le 12 octobre aux îles de Sion (PJC). C'est la deuxième donnée pour cette espèce en plaine. La perdrix grise (*Perdix perdix*) a niché à Grimisuat où un couple a été vu avec une dizaine de poussins (CB). Elle est introduite actuellement un peu partout en Valais.

Une marouette ponctuée (*Porzana porzana*) a chanté le 15 juin à Grône (PJC). C'est la première fois que cette espèce a été observée en période de nidification en Valais. Le râle de genêts (*Crex crex*) a été entendu le 26 juillet 1967 à Varone (F. Burnier) et le 24 août de cette année à Agarn. Les données pour cette espèce se font plus rares en Suisse.

Deux vanaux huppés (*Vanelus vanelus*) se trouvent le 20 juin à Verbier tout à fait en dehors de leur région de reproduction. Cette espèce a niché cette année dans les Grisons et est en extension dans toute la Suisse. Une bécassine (*Gallinago gallinago*) baguée le 24 août à Agarn a été tuée le 4 septembre soit 11 jours plus tard à Bergame dans le nord de l'Italie (160 km. Est-Sud-Est). Cette reprise montre le passage des oiseaux par le col du Simplon. Un chevalier probablement un cul blanc (*Tringa ochropus*) a hiverné à Finges (R. P. Bille). Les chevaliers suivants ont été notés cette année: le chevalier arlequin (*Tringa erythropus*) trois fois, le chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) deux fois, le chevalier gambette (*Tringa totanus*) une fois et le chevalier combattant (*Philomachus pugnax*) trois fois.

Du 10 au 26 décembre 1967 des mouettes rieuses (*Larus ridibundus*) sont venues chaque jour à Sion (100 le 16, 10 le 20). Elles se tenaient près du pont du Rhône à la sortie Est de la ville. Chaque soir entre seize et dix-sept heures elles se dirigeaient vers le Léman où elles allaient probablement passer la nuit. Parmi elles se tenaient une mouette albinos. Pour la deuxième fois une mouette pigmée s'est arrêtée à Agarn (12 août CB).

Le nombre des tourterelles turques (*Streptopelia decacto*) a augmenté très rapidement à Sion: treize individus en 1966, trente en 1967. Elle a niché au Collège de Sion où nous avons trouvé les coquilles des œufs

après l'éclosion (le nid était inaccessible). Un coucou (*cuculus canorus*) de la phase rousse est resté très tard en Valais: un individu le 18 novembre 1967 à Châteauneuf (CB).

La présence du hibou grand-duc (*bubo bubo*) n'est signalée que par les individus qui se tuent contre les fils électriques. Un mâle a été trouvé le 10 avril à Vissoie et nous a été remis par R. Fellay du service de la chasse que nous remercions de sa collaboration. La présence de la chouette chevêchette (*glauclidium passerinum*) a été prouvée à Nendaz, à Verbier et aux Mayens de Riddes (GdJ). Trois jeunes ont été vus par Imboden le 20 juillet à Goppenstein. Cette année nous avons plusieurs observations du hibou moyen-duc (*asio otus*) en montagne. J'ai trouvé un nid avec quatre œufs le 31 mai à Arolla à 2100 m. (nid le plus haut de Suisse). D'autre part, les moyens-ducs de la plaine doivent monter assez haut pour chasser en période de nidification, car l'analyse des pelottes de réjection a permis de trouver la capture du campagnol des neiges (*microtus nivalis*) et du campagnol des champs (*microtus arvalis*). En 1966 la chouette de Tengmalm (*aegolius funerlus*) a niché dans une grange à Ravoire (G. Laurent). C'est la première fois qu'un tel site est occupé par cette espèce en Suisse.

Un pipit à gorge rousse (*anthus cervinus*) s'est arrêté le 19 avril à Agarn en compagnie de bergeronnettes printanières (CB), et est resté jusqu'au 21. Le 21 au soir pendant que nous le surveillons nous sommes témoins d'une rencontre peu commune. Tout à coup le pipit s'immobilise et émet par trois fois son cri, beaucoup plus fort que précédemment; quelques secondes plus tard un deuxième individu vient se poser près de lui et ils vont dormir ensemble dans les roseaux. Cet oiseau est rare, de passage en Europe occidentale, et n'a été identifié que ces dernières années. Deux couples au moins de bergeronnettes printanières (*motacilla flava*) ont niché cette année à Agarn. Il s'agit de la sous-espèce à tête cendrée (m. f. *cinereocapilla*).

Quelques jaseurs (*bombycilla garrulus*) ont été signalés en Suisse cette année, 30 individus ont passé à Vouvry le 30 décembre (PJC) et 15 le 5 janvier à Grône (GdJ).

Des gorgebleues (*Luscinia luscinia*) ont été vues en migration à Agarn le 11 avril. La grive litorne (*turdus filaris*) a niché aux Haudères cette année, c'est le premier lieu connu dans le Valais central.

C. Bottani a défini l'aire de nidification de la fauvette orphée (*silvia hortensis*) dans le Haut-Valais. Les chanteurs sont réguliers, quoique très clairsemés et limités aux endroits favorables, entre Loèche et Moerel. C. Imboden l'a également entendu à Goppenstein à 1200 m. d'altitude. Plusieurs nids ont été trouvés lors de la construction (CB). Cette espèce a été trouvée cette année au Tessin (Schifferli) et dans la vallée d'Aoste (P. Géroudet). La fauvette épervière (*silvia nisoria*) a chanté le 22 mai à Agarn où la nidification n'est pas exclue pour cette année. Cette espèce a été signalée en plusieurs endroits en Suisse cette année et a probablement niché au Tessin. Jusqu'à maintenant on ne connaissait qu'une preuve de nidification pour la Suisse.

Une mésange monette (*parus palustris*) a été observée les 24 et 26 juin aux Haudères (PJC). Le tichrodrome (*tichrodroma muraria*) a niché dans les gorges de la Borgne et de Derocha à Grône. A cet endroit les adultes nourrissent deux jeunes volant déjà bien, le 28 juin.

Le nid du bruant proyer (*imberiza calandra*) a enfin été trouvé à Agarn, pour la première fois en Valais le 12 août 1968 (CB). Un adulte et trois jeunes ont été bagués. Deux nouvelles observations de gros-bec en Valais central (*coccothraustes coccothraustes*): un le 15 avril à Aproz et un le 26 juin à Mâche (PJC). L'étourneau (*sturnus vulgaris*) se répand dans les vallées latérales et niche jusque vers 1000 m.: un couple le 17 avril cherche une cavité à Basse-Nendaz (PJC), un individu le 5 mai à Bruson et un couple nourrissant des jeunes le 28 mai à Mollens (CB).

Le grand corbeau (*corvus corax*) a niché dans les rochers de Tourbillon à Sion. Malgré plusieurs tentatives de dénichage un jeune a réussi à quitter le nid.